



Semaine du lundi 31 mars 2025

Sommaire

I	Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou dans un champ magnétique	1
II	Théorie cinétique des gaz parfait	3

Au programme cette semaine :

I Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou dans un champ magnétique

1. Force de Lorentz

- (a) définition
- (b) transfert d'énergie du champ électrique à une particule

|| **Capacité exigible :** Justifier qu'un champ électrique peut modifier l'énergie cinétique d'une particule alors qu'un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d'énergie à la particule.

2. Action d'un champ électrique sur une particule chargée

- (a) accélération linéaire d'une particule chargée

|| **Capacité exigible :** Effectuer un bilan énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse d'une particule chargée accélérée par une différence de potentiel.

- (b) mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme et constant

|| **Capacité exigible :** Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur accélération constant.

- (c) déviation d'un faisceau d'électron

3. Action d'un champ magnétostatique sur une particule chargée

|| **Capacité exigible :** Déterminer le rayon de la trajectoire et le sens de parcours.

- (a) équation du mouvement
- (b) nature du mouvement
- (c) application : le cyclotron




FIGURE 1 – Cyclotron




FIGURE 2 – Synchrotron soleil

II Théorie cinétique des gaz parfait

1. Hypothèses de la théorie cinétique des gaz parfaits

(a) Agitation thermique




FIGURE 3 – Marche aléatoire : entre deux chocs, le mouvement est rectiligne.




FIGURE 4 – exemples de marche aléatoire à deux dimensions. On peut montrer que la distance moyenne parcourue après N pas de longueur ℓ est de l'ordre de $\sqrt{N} \ell$ (rayon du cercle rouge).

|| **Remarque :** La distance moyenne parcourue entre deux chocs est appelée **libre parcours moyen**.

(b) Vitesse d'ensemble du gaz

(c) Moyenne temporelle, moyenne statistique

|| **Hypothèse ergodique :** On suppose que la moyenne statistique d'une grandeur physique à t sur les particules du gaz se confond avec la moyenne temporelle de cette même grandeur pour une particule donnée.

(d) Équilibre statistique, distributions des vitesses

|| **Capacité exigible :** Distribution des vitesses v moléculaires d'un gaz (homogénéité et isotropie). Vitesse quadratique moyenne.

|| **Remarque :** La vitesse quadratique moyenne u pour un gaz vérifie :

$$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

|| où $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ est la constante de Boltzmann.

2. Pression cinétique

(a) Définition

(b) Choc entre une particule et la paroi

(c) Un calcul simplifié de la pression cinétique

|| **Capacité exigible :** Utiliser un modèle unidirectionnel avec une distribution discrète de vitesse pour montrer que la pression est proportionnelle à la masse des particules, à la densité particulaire et au carré de la vitesse quadratique moyenne.

3. Température cinétique et énergie interne

|| **Capacité exigible :** Température cinétique. Exemple du gaz parfait monoatomique : $E_c = \frac{3}{2} k_B T$. Calculer l'ordre de grandeur d'une vitesse quadratique moyenne dans un gaz parfait.

- (a) Définition de la température cinétique
- (b) Équation d'état du gaz parfait
- (c) Énergie interne
- (d) Cas des gaz parfaits diatomiques

|| **Idée :** La température est la manifestation des degrés de liberté dans un gaz (translation, rotation, vibration).
Pour un gaz parfait diatomiques, l'énergie interne du gaz passe de $U = \frac{3nRT}{2}$ puis $U = \frac{5nRT}{2}$ (si on prend en compte la rotation) et $U = \frac{7nRT}{2}$ (si on prend en compte la vibration).